



BOLETIM MENSAL DA DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS – ABRIL 2018

Gerência de Monitoramento de Qualidade das Águas

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Maio de 2018



SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Secretário

Germano Luiz Gomes Vieira

Secretário-Adjunto

Anderson Silva de Aguiar

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Diretora geral

Marília Carvalho de Melo

Diretoria de Operações e Eventos Críticos

Heitor Soares Moreira

Gerente de Monitoramento de Qualidade das Águas

Katiane Cristina de Brito Almeida

Equipe Técnica

Carolina Cristiane Pinto, Engenheira Química

Mariana Elissa Vieira de Souza, Geógrafa

Maricene Menezes de Oliveira Mattos Paixao, Geóloga

Matheus Duarte Santos, Geógrafo

Natália Manuele Gomes de Oliveira, graduanda em Engenharia Ambiental

Regina Márcia Pimenta Assunção, Bióloga

Sérgio Pimenta Costa, Biólogo

Vanessa Kelly Saraiva, Química



BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS VELHAS

A bacia hidrográfica do rio das velhas localiza-se na região central do Estado de Minas Gerais, entre as coordenadas 17°15'S e 20°25'S – 43°25'W e 44°50'W, e corresponde a Unidade de Planejamento de Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) SF5. Possui uma área de 29173 Km², composta por 51 municípios e com uma população de 4,8 milhões de habitantes, e a bacia é subdividida em três territórios (Alto, Médio e Baixo). O rio das Velhas é o maior afluente em extensão da bacia do rio São Francisco, tendo sua nascente no município de Ouro Preto, desaguando no rio São Francisco, a jusante da barragem de Três Marias. Possui cerca de 761 km de extensão, 38,4 m de largura média, drenando uma área de 29.173 km².

A avaliação da densidade de cianobactérias da rede de monitoramento da qualidade do rio das Velhas é composta por 23 pontos de coleta. Para a avaliação das densidades de cianobactérias, no rio das Velhas, o IGAM prioriza os locais em que predominam condições potencialmente propícias ao desenvolvimento de florações de cianobactérias, nesse caso, toda a calha do rio das Velhas. As amostras, coletadas mensalmente e trimestralmente, passam por análises laboratoriais, onde são avaliados cerca de 50 parâmetros. Salienta-se que, a partir de julho de 2017, houve redução na frequência de coleta em 13 estações que passaram a ser trimestrais. As demais estações (BV105, BV139, BV141, BV146, BV148, BV149, BV150, BV151, BV152 e BV156) permaneceram com o monitoramento mensal.

Neste boletim, foram considerados os resultados da avaliação da densidade de cianobactérias e concentração de cianotoxinas (microcistina e saxitoxina) para o período de janeiro de 2017 a abril de 2018. Contudo, não houve coleta no segundo trimestre de 2017. Na Tabela 1 são apresentadas as estações de monitoramento nas quais é avaliada a densidade de cianobactérias, bem como os municípios, classe de enquadramento e descrição das mesmas.

Tabela 1: Descrição das estações de monitoramento nas quais ocorre avaliação da densidade de cianobactérias no rio das Velhas.

Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV001	Rio das Velhas	Classe Especial	Ouro Preto	Rio das Velhas próximo a sua nascente
BV013	Rio das Velhas	Classe 2	Itabirito	Rio das Velhas a montante da foz do Rio Itabirito
BV037	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a jusante da foz do Rio Itabirito
AV210	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas na cidade de Rio Acima
BV139	Rio das Velhas	Classe 2	Rio Acima	Rio das Velhas a montante da ETA/COPASA, em Bela Fama
BV063	Rio das Velhas	Classe 2	Nova Lima, Raposos	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Água Suja
BV067	Rio das Velhas	Classe 2	Sabará	Rio das Velhas a montante do ribeirão Sabará
BV080	Rio das Velhas	Classe 3	Sabará	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão Sabará
BV083	Rio das Velhas	Classe 3	Sabará	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão Arrudas
BV105	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas logo a jusante do Ribeirão do Onça
BV153	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do Ribeirão da Mata
SC16	Rio das Velhas	Classe 3	Santa Luzia	Rio das Velhas a jusante do aterro sanitário da Santa Luzia



Estação	Curso D'água	Classe de Enquadramento	Municípios	Descrição
BV137	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas na Ponte Raul Soares, em Lagoa Santa
BV138	Rio das Velhas	Classe 3	Lagoa Santa	Rio das Velhas no Parque do Sumidouro em Lagoa Santa
BV156	Rio das Velhas	Classe 2	Baldim	Rio das Velhas a jusante do Rio Jabuticatubas
BV141	Rio das Velhas	Classe 2	Santana de Pirapama	Rio das Velhas na cidade de Santana do Pirapama
BV142	Rio das Velhas	Classe 2	Inimutaba, Presidente Juscelino	Rio das Velhas a jusante do ribeirão Santo Antônio
BV150	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória
BV152	Rio das Velhas	Classe 2	Santo Hipólito	Rio das Velhas entre os Rios Paraúna e Pardo Grande
BV146	Rio das Velhas	Classe 2	Augusto de Lima, Corinto	Rio das Velhas a jusante do rio Pardo Grande
BV151	Rio das Velhas	Classe 2	Lassance	Rio das Velhas a jusante do córrego do Vinho em Lassance
BV148	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas na cidade de Várzea da Palma
BV149	Rio das Velhas	Classe 2	Várzea da Palma	Rio das Velhas a montante da sua foz no rio São Francisco em Guaicuí

As cianobactérias são microorganismos presentes em ambientes aquáticos e têm se tornado um problema em todo o mundo devido à possibilidade de produzirem toxinas altamente potentes, denominadas cianotoxinas e também à capacidade de desenvolver florações. Assim, quando tais florações ocorrem em corpos de água destinados ao abastecimento ou recreação estes organismos podem alterar os ambientes aquáticos e terrestres e trazendo riscos à saúde humana e animal.

A produção de toxina em cada espécie de cianobactéria varia em função da interação de diversos fatores, como a genética, o estado fisiológico do organismo e os parâmetros ambientais. Assim, uma mesma espécie pode produzir toxinas em um ambiente e não produzi-las em outro. As microcistinas são cianotoxinas hepatotóxicas, ou seja, atacam o fígado, onde produzem um efeito acumulativo e ocorrem com frequência podendo chegar a altas concentrações em água bruta. As saxitoxinas são cianotoxinas neurotóxicas e promovem o bloqueio neuromuscular do organismo. Sua presença vem sendo detectada em diferentes mananciais brasileiros.

O manual da Organização Mundial de Saúde - OMS considera três vias de exposição às cianobactérias em águas recreacionais: contato direto de partes expostas do corpo (incluindo ouvidos, olhos, boca, garganta e áreas cobertas com roupa de banho que podem capturar e concentrar células), a ingestão acidental e a inalação de água contendo células de cianobactérias.



RESULTADOS:

Densidade de Cianobactérias

Na tabela 2 são apresentados os resultados das contagens de cianobactérias do período de janeiro de 2017 a abril de 2018 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na sub-bacia do rio das Velhas. Valores em negrito indicam resultados acima do máximo permitido pela Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008.

O maior valor obtido na calha do rio das Velhas, na coleta realizada entre os dias 9 a 26 de abril de 2018, foi de 90.816 cél/mL na estação de amostragem BV150 localizada no rio das Velhas a jusante do rio Paraúna, em Senhora da Glória, 80.334 cél/mL na estação de amostragem BV142 localizada no rio das Velhas a jusante do ribeirão Santo Antônio e 51.809 cél/mL na estação de amostragem BV152 localizada no rio das Velhas entre os Rios Paraúna e Pardo Grande. Todos os demais resultados para o mês de abril de 2018 estão abaixo do limite estabelecido para rios de Classe 2 e 3, na Deliberação Normativa conjunta COPAM/CERH nº 01 de 2008 que é de 50.000 cél/mL e 100.000 cél/mL, respectivamente.

Destaca-se que dentre os usos preponderantes estabelecidos para rios de Classe 2 está a recreação de contato primário cujo valor máximo permitido é de 10.000 cél/mL. Dessa forma, além das três estações citadas acima, os resultados das estações BV083, BV105, BV141, BV146, BV151 e BV158 estão acima do valor máximo permitido para contato primário. Todos os demais resultados estão abaixo desse limite.

Dentre os principais fatores de pressão que podem contribuir para elevadas densidades de cianobactérias destacam-se o aporte de nutrientes provenientes principalmente dos esgotos sanitários da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o lançamento de efluentes de indústrias dos ramos têxtil, alimentício, laticínios, produção sucroalcooleira, além das atividades de agricultura e silvicultura presentes na região avaliada.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
 Instituto Mineiro de Gestão das Águas

Tabela 2: Resultados da densidade de cianobactérias (cél/mL) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de janeiro de 2017 a abril de 2018.

Estação	Classe de Enquadramento	2017							2018			
		Jan	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr
BV001	Classe Especial	388	0	-	-	102	-	-	<1,00	-	-	20
BV013	Classe 2	31	37	-	-	145	-	-	27	-	-	0
BV037	Classe 2	71	30	-	-	0	-	-	92	-	-	214
AV210	Classe 2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
BV139	Classe 2	41	19	0	1	12	20	<1,00	0	0	0	286
BV063	Classe 2	0	4	-	-	37	-	-	41	-	-	<1,00
BV067	Classe 2	20	29	-	-	0	-	-	<1,00	-	-	184
BV080	Classe 3	<1,00	71	-	-	0	-	-	0	-	-	214
BV083	Classe 3	<1,00	240	-	-	77	-	-	0	-	-	21.390
BV105	Classe 3	<1,00	395	551	3.083	10.613	10.695	944	1.382	9.307	1.502	10.695
BV153	Classe 3	171	5.592	-	-	-	-	-	31	-	-	8.286
SC16	Classe 3	-	-	-	-	23.039	-	-	-	-	-	-
BV137	Classe 3	4.474	1.712	-	-	24.533	-	-	2.531	-	-	4.580
BV138	Classe 3	286	1.976	-	-	36.126	-	-	1.388	-	-	7.756
BV156	Classe 2	355	1.456	1.709	3.551	66.945	63.630	327	620	588	61	4.392
BV141	Classe 2	61	1.859	1.431	0	94.376	9.887	2.204	400	65	112	21.961
BV142	Classe 2	116	3.613	-	-	479.064	-	-	1.905	-	-	80.334
BV150	Classe 2	20	1.123	3.021	163	292.108	24.312	735	231	61	82	90.816
BV152	Classe 2	33	2.906	816	265	287.536	15.773	2.939	278	0	0	51.809
BV146	Classe 2	31	1.890	765	898	517.271	15.757	408	3.837	0	0	32.738
BV151	Classe 2	100	1.165	3.037	10.368	32.656	571	14.369	276	0	10	30.648
BV148	Classe 2	193	1.653	15.512	29.848	873.140	414	2.980	893	<1,00	0	13.928
BV149	Classe 2	19	21.206	8.761	29.227	21.267	3.170	4.490	159	<1,00	0	474

Os valores < 1,00 indicam que o organismo não ocorreu nos ensaios qualitativo e quantitativo

Os valores 0 indicam que o organismo ocorreu apenas no ensaio qualitativo.



Concentração de cianotoxinas:

Nas estações onde há a presença de cianobactérias em densidades superiores a 20.000 cél/mL é realizada a análise de cianotoxinas. No Brasil a única legislação que estabelece limites para concentração de cianotoxinas é a Portaria do Ministério da Saúde nº 2914 de 12/12/2011 (Federal), que estabelece procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano. Nessa portaria o limite para presença de microcistinas é de 1 µg/L e de saxitoxinas 3 µg/L.

Na tabela 3 são apresentados os resultados da concentração de microcistina do período de janeiro de 2017 a abril de 2018 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Os resultados de se encontram abaixo do limite estabelecido na Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.

Tabela 3: Resultados da concentração de microcistina (µg/L) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período de janeiro de 2017 a abril de 2018.

Estação	2017					2018			
	Jan	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
BV083	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,15
BV105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC16	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-
BV137	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-
BV138	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-
BV156	-	-	<0,15	<0,15	-	-	-	-	-
BV141	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	<0,15
BV142	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	<0,15
BV150	-	-	<0,15	<0,15	-	-	-	-	<0,15
BV152	-	-	0,18	-	-	-	-	-	<0,15
BV146	-	-	0,19	-	-	-	-	-	<0,15
BV151	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	<0,15
BV148	-	-	<0,15	-	-	-	-	-	-
BV149	-	<0,15	0,38	-	-	-	-	-	-

Na tabela 4 são apresentados os resultados da concentração de saxitoxina do período de janeiro de 2017 a abril de 2018 para as estações monitoradas pelo IGAM que estão localizadas na calha do rio das Velhas. Todos os resultados estiveram abaixo do limite estabelecido pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde.



Tabela 4: Resultados da concentração de saxitoxina ($\mu\text{g/L}$) nas amostras de água coletadas no rio das Velhas no período janeiro de 2017 a abril de 2018.

Estação	2017					2018			
	Jan	Jul	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr
BV083	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02
BV105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BV153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SC16	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
BV137	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
BV138	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
BV156	-	-	0,04	<0,02	-	-	-	-	-
BV141	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03
BV142	-	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03
BV150	-	-	0,02	<0,02	-	-	-	-	0,03
BV152	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,03
BV146	-	-	0,02	-	-	-	-	-	0,03
BV151	-	-	0,04	-	-	-	-	-	0,03
BV148	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
BV149	-	<0,02	0,03	-	-	-	-	-	-

PROJETO ÁGUAS DE MINAS

O Projeto Águas de Minas, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais. Em execução desde 1997, o programa disponibiliza uma série histórica que permite avaliar a evolução da qualidade das águas no Estado e gera dados indispensáveis ao gerenciamento dos recursos hídricos, como informações relativas às áreas prioritárias para o controle da poluição.

Informações sobre o programa de monitoramento de qualidade de água acesse o portal Infohidro (<http://portalinfohidro.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/monitoramento/agua-superficial>).